

Aangeboren cytomegalie (CMV) en slechthorendheid bij uw kind

Informatie voor ouders

Wat is CMV?

CMV (cytomegalovirus) is een heel gewoon virus waarmee vrijwel iedereen over de hele wereld besmet is.

Soms geeft besmetting griepachtige symptomen, soms merken wij er helemaal niets van.

CMV besmetting bij een ongeboren kind wordt congenitale (aangeboren) CMV (cCMV) genoemd. Deze besmetting is verantwoordelijk voor 10 tot 20% van de slechthorendheid bij kinderen.



Hoe vaak komt cCMV voor?

In Engeland wordt cCMV geconstateerd bij 1:200 geboortes. 90% van de baby's met cCMV wordt geboren zonder dat er symptomen van het virus te zien zijn. Dit wordt een asymptomatische besmetting bij de geboorte genoemd. Bij 10% van de geboortes zijn symptomen zichtbaar. Dit heet een symptomatische besmetting.

Wat zijn mogelijke symptomen?

- Laag geboortegewicht.
- Klein hoofdje.
- Vergrote lever.
- Gele huid en ogen.
- Oogproblemen.
- Slechthorendheid.

Symptomatische cCMV kan ook op latere termijn effecten hebben op de ontwikkeling van het kind. Slechthorendheid is hierbij het meest voorkomend.

Hoeveel kinderen met cCMV zijn slechthorend?

- Bij kinderen die geboren worden met symptomen van CMV is of wordt de helft slechthorend.
- Bij kinderen die geboren worden zonder symptomen wordt één op de tien kinderen slechthorend.

Bij de helft van de kinderen die slechthorend zijn ten gevolge van de cCMV is de slechthorendheid aanwezig vanaf de geboorte. Bij de gehoorscreening vlak na de geboorte worden deze kinderen gevonden.

Bij de andere helft ontwikkelt zich de slechthorendheid later. Meestal gebeurt dit in de eerste drie levensjaren. Dit kan een effect hebben op de spraak- en taalontwikkeling. In een beperkt aantal gevallen kan de slechthorendheid zich ook nog op latere leeftijd ontwikkelen. In verband hiermee is het belangrijk dat het gehoor van deze kinderen regelmatig onderzocht wordt.

Wat voor soort slechthorendheid wordt door cCMV veroorzaakt?

De slechthorendheid varieert van een mild verlies in één oor tot een totale doofheid in beide oren. Meestal is het gehoorverlies blijvend. In de loop van de tijd kan het gehoor nog een beetje veranderen. Bij de helft van de slechthorende kinderen kan het gehoorverlies in ernst toenemen.

Audiologisch onderzoek.

Ons advies is om bij alle kinderen met cCMV het gehoor vóór de leeftijd van 3 maanden uitgebreid te onderzoeken gevolgd door een controle na 6 maanden.

Daarna lijkt het voldoende om jaarlijks, tot een leeftijd van 6 jaar, het gehoor te laten onderzoeken.

Zodra ouders het gevoel hebben dat het gehoor van hun kind verandert of dat de spraaktaalontwikkeling achterblijft, is het verstandig dat zij direct contact opnemen met het Audiologisch Centrum voor nader onderzoek.

Contact

Hebt u na het lezen van deze informatie nog vragen, neem dan contact met ons op.

Audiologisch Centrum

043-387 45 94

Websites

- www.mumc.nl
- www.kno.mumc.nl/audiologisch-centrum-maastricht
- www.gezondidee.mumc.nl

Odin 037560 / uitgave mei 2016

Bezoekadres
P. Debyelaan 25
6229 HX Maastricht

Postadres
Postbus 5800
6202 AZ Maastricht

Algemeen telefoonnummer
043-387 65 43
www.mumc.nl



Maastricht UMC+