

Amitriptyline

fabrieksnaam: Amitriptyline, Sarotex

Uw arts heeft met u gesproken over een behandeling met amitriptyline. In dit blad krijgt u aanvullende informatie over dit medicijn.

Algemene informatie

Amitriptyline is van oorsprong een antidepressivum en wordt incidenteel gebruikt om depressieve klachten te behandelen. Later is gebleken dat dit medicijn, gegeven in een lage dosering, een pijnstillend effect heeft. Tegenwoordig wordt dit middel gebruikt bij de behandeling van chronische pijn zoals:

- prikkelbare darmsyndroom;
- niet verklaarde buikklachten.



Hoe werkt Amitriptyline?

Amitriptyline vermindert de overgevoeligheid (via zenuwbanen) van het maag-darmstelsel waardoor de pijn afneemt. Daarnaast vertraagt het de voortstuwing van de ontlasting waardoor de ontlasting indikt en u minder last van diarree hebt. Amitriptyline werkt niet direct, zoals paracetamol, maar pas na het opbouwen van een spiegel in het lichaam. Dit duurt ongeveer twee tot drie weken.

Hoe gebruikt u de Amitriptyline?

Amitriptyline wordt in een lage dosering gestart. U neemt dit medicijn één maal daags voor het slapen gaan in met een glas water. U mag niet kauwen op de tabletten.

Als na enkele weken het effect bij u onvoldoende is, kan de arts de dosering verhogen.

Hebt u last van een van bovengenoemde klachten, neem dan contact op met uw arts.

Let op: Gebruikt u medicatie in verband met hartklachten of depressie, geeft dit dan door aan uw arts. Het gebruik van alcohol tijdens behandeling met amitriptyline raden wij af omdat dit bijwerkingen en het kalmerend effect kan versterken.

Wanneer moet u amitriptyline niet innemen?

- Bij overgevoeligheid voor amitriptyline.
- Medicijnen in de groep van de tricyclische antidepressiva.
- Na een recent doorgemaakt hartinfarct.
- Hartblokkade of hartritmestoornis.
- Ernstige leverziekte.

Wat zijn de bijwerkingen?

Bijwerkingen zijn vaak van korte duur bij het opstarten van de medicatie. De volgende bijwerkingen komen het meeste voor na het starten van de medicatie:

- sufheid;
- duizeligheid;
- misselijkheid ;
- droge mond;
- obstipatie;
- Amitriptyline beïnvloedt ook de rijvaardigheid.

Stoppen met amitriptyline

Wilt u stoppen met de medicatie, bespreek dit dan eerst dan met uw arts voordat u stopt. Zo voorkomt u eventuele bijwerkingen van het stoppen van de medicatie.

Amitriptyline kan op strikte indicatie gebruikt worden in de zwangerschap en bij borstvoeding, maar overleg met uw arts of dit moet.

Bent u zwanger

Gebruik dit medicijn alleen tijdens de zwangerschap na overleg met uw arts.

Autorijden

Overleg met uw arts als u de medicatie wilt innemen en wilt autorijden.

Afhankelijk van de dosis mag u na enkele weken na start van de medicatie autorijden.

Hebt u last van bijwerkingen, dan mag u niet autorijden.

Vergoeding

Dit medicijn wordt onder bepaalde voorwaarden vergoed. U kunt dit navragen bij de apotheek.

Contact

Hebt u na het lezen van deze informatie nog vragen, neem dan contact met ons op.

Polikliniek MDL

043-387 51 00 tijdens kantooruren

Websites

- www.mdl.mumc.nl
- www.mumc.nl
- www.mdls.nl
- www.gezondidee.mumc.nl
-

Odin 048237 uitgave: augustus 2018

Bezoekadres
P. Debyelaan 25
6229 HX Maastricht

Postadres
Postbus 5800
6202 AZ Maastricht

Algemeen telefoonnummer
043-387 65 43
www.mumc.nl