

## Buikwandcorrectie

### De operatie en nazorg

---

Door extreme vermagering, zwangerschappen, veroudering of operaties kan uw buikwand zo ernstig verslappen dat er een hangbuik ontstaat. In het Maastricht UMC+ kunnen we een hangbuik met behulp van plastische chirurgie corrigeren. Met een medische term heet deze operatie abdomino- of buikwandplastiek. In gevallen van extreme vermagering kan er ook een circulaire of een lower bodylift worden uitgevoerd. Op dit blad krijgt u informatie over de operatie en de nazorg.

#### Verwachtingen

Als u overweegt een buikwandcorrectie te ondergaan, is het belangrijk dat u hierover een reëel verwachtingspatroon hebt. Een buikwandcorrectie heeft als resultaat dat uw buik platter wordt, en dat het huidoverschot wordt verwijderd, maar totale perfectie moet u niet verwachten. Daarnaast zal de operatie littekens achterlaten die enigszins zichtbaar blijven. Deze zijn met ondergoed meestal goed te verbergen. Een ander gevolg van een buikwandcorrectie is dat het huidgebied onder de navel tijdelijk gevoelloos wordt en soms blijft. Hier hebt u weinig klachten van.



*Na een buikwandcorrectie*

#### Vergoeding van de kosten

Een buikwandcorrectie is meestal een cosmetische operatie en wordt in het algemeen niet vergoed door de ziektekostenverzekeraar. U moet de operatie dus meestal zelf betalen. U krijgt van de plastisch chirurg vooraf een opgave van de kosten. In gevallen van extreme vermagering kunt u in aanmerking komen voor een lower body lift. Hier zijn echter verzekeringstechnisch wel voorwaarden aan verbonden. De plastisch chirurg informeert u hierover.

#### Vorbereiding

- Gebruikt u medicijnen, meldt dit dan al tijdens het eerste bezoek aan de plastisch chirurg. Bepaalde medicijnen mag u een aantal dagen voor de operatie niet meer slikken.
- Hebt u eerder al een buikoperatie gehad, dan is het belangrijk dit u dit vertelt tijdens het polibezoek.
- U moet minstens zes weken voor de operatie stoppen met roken. Nicotine vernauwt de bloedvaten waardoor de wondgenezing verstoord wordt.
- Bent u te zwaar, dan adviseert de plastisch chirurg u eerst af te vallen. Het operatieresultaat is dan beter en het risico op complicaties vermindert.
- De anesthesioloog bespreekt met u de anesthesie (narcose).

#### De operatie

Een buikwandcorrectie wordt uitgevoerd onder algehele anesthesie (narcose). De operatie duurt gemiddeld twee uur. U verblijft een of twee dagen in het ziekenhuis. Bij de operatie maakt de plastisch chirurg de buikwand los van de onderliggende spierlaag tot aan de ribbenboog en het borstbeen. De navel wordt rondom ingesneden, zodat deze op zijn plaats

blijft. Daarna trekt de plastisch chirurg de huid strak en verwijdert de overtollige huid en het onderhuidse vetweefsel. Als uw buikspieren uitgerekt zijn, worden deze meteen verstevigd.

Om de navel weer naar buiten te laten komen, wordt een gaatje in de buikhuid gemaakt. Daar wordt de navel vervolgens in gehecht met onoplosbare hechtingen.

De buikhuid wordt zowel in- als uitwendig gehecht met oplosbare hechtdraden

De littekens van een buikwandcorrectie lopen rond de navel en grotendeels binnen de bikinilijn.

Tijdens de operatie brengt de plastisch chirurg eventueel een aantal drains (dunne slangetjes) in waardoor het overtollige wondvocht naar buiten kan.

De drains moeten blijven zitten tot er bijna geen wondvocht geproduceerd wordt. Meestal duurt dit twee tot drie dagen.

In geval van een lower body lift wordt ook de achterzijde gecorrigeerd. Bij de lower body lift wordt niet alleen de buik maar ook de schaamregio, de buitenzijde van de heup en bovenbeen regio, evenals de bil regio gecorrigeerd. Dit is een grotere ingreep, u blijft in dit geval vier tot vijf dagen in het ziekenhuis.

## Na een buikwandcorrectie

- U blijft een tot drie dagen in het ziekenhuis, in geval van lower body lift vier tot vijf dagen.
- na twee weken komt u op de polikliniek voor het verwijderen van de hechtingen.
- De eerste zes weken na de operatie mag u niet zwaar tillen. U moet oppassen met rekken en strekken, niet persen en zorgen voor een goede stoelgang.
- Over het algemeen is een buikwandcorrectie of lower body lift niet pijnlijk.
- Ter ondersteuning van de buikwand moet u gedurende zes weken een steunend korset om uw buik of een stevig panty broekje dragen.
- U dient dagelijks te douchen en de wond eventueel te verbinden.
- U mag pas auto rijden na het verwijderen van de hechtingen en op geleide van de klachten. Sporten mag u na 6 weken weer hervatten, ook op geleide van de klachten.

De totale herstelperiode van een buikwandcorrectie of lower body lift is ongeveer zes weken. Als u tijdens de herstelperiode last krijgt van buikpijn, zwelling of koorts, neem dan contact op met de plastisch chirurg.

## Complicaties

- Een buikwandcorrectie heeft dezelfde risico's als elke andere operatie.
- De wond kan nabloeden, er kan een infectie optreden, koorts, en verlies van vies geurend vocht.
- Als er een nabloeding optreedt, moet u nog een keer geopereerd worden om het nabloedende vaatje te dichtten.
- De meeste kans op infectie bestaat bij mensen die teveel onderhuids vetweefsel hebben. Het is daarom van belang om vóór de operatie een zo normaal mogelijk gewicht te hebben.
- Gestoorde wondgenezing en weefselversterf (necrose) leiden tot minder goede resultaten, met eventueel als gevolg een breder litteken.
- Een late complicatie van een buikwandcorrectie kan zijn dat er nog wat overtollig huid aanwezig is op de heupen. Meestal trekt dit na verloop van tijd weg. Soms is het nodig om deze 'dogears' (hondenoren) te verwijderen. Dit kan meestal gebeuren onder plaatselijke verdoving.
- De lower bodylift is een grotere ingreep en er bestaat ook een grotere kans op het krijgen van bovengenoemde complicaties. Deze zijn over het algemeen goed te behandelen, echter duurt in deze gevallen de herstelperiode langer.

## Contact

Wij behandelen u naar beste kunnen. Garantie op het resultaat kunnen wij u echter niet geven. Wij vinden het belangrijk dat u goed op de hoogte bent van de mogelijkheden, onmogelijkheden en risico's. Hebt u nog vragen na het lezen van deze informatie, neem dan contact met ons op.

Telefoon polikliniek Plastische Chirurgie

043-387 70 00

## Website

- [www.azm.nl](http://www.azm.nl)
- [www.plastischechirurgie.mumc.nl](http://www.plastischechirurgie.mumc.nl)
- [www.gezondidee.mumc.nl](http://www.gezondidee.mumc.nl)

*Odin 035950 / Uitgave februari 2018*

---

Bezoekadres  
P. Debyelaan 25  
6229 HX Maastricht

Postadres  
Postbus 5800  
6202 AZ Maastricht

Algemeen telefoonnummer  
043-387 65 43  
[www.mumc.nl](http://www.mumc.nl)