

## Correctie afstaande oren

U hebt besloten uw afstaande oren van uzelf of van uw kind te laten corrigeren bij de polikliniek Plastische Chirurgie. Afstaande oren zijn een aangeboren misvorming van het kraakbeenskelet van de oorschelp. De medische term voor deze correctie is otoplastiek (oto betekend oor en plastiek komt van plastische chirurgie). Een otoplastiek kan worden uitgevoerd vanaf de leeftijd van vijf à zes jaar.

Op dit blad krijgt u informatie over de operatie. U vindt de polikliniek Plastische Chirurgie op niveau 1. [Volg route 7-1 \(blauw\)](#)

### Uw verwachtingen

Het is belangrijk om reële verwachtingen te hebben ten aanzien van het resultaat van deze operatie. U kunt een duidelijke verbetering van de stand van de oren verwachten maar geen perfectie. Ook is een absolute symmetrie (gelijkheid) van de stand van de oren vrijwel onmogelijk. Door de operatie blijft een litteken achter. Dit valt echter niet op, omdat het achter het oor verborgen is.

### Vorbereiding

- Voorafgaand aan de operatie krijgt u een oproep van de poli Anesthesie De anesthesist informeert u over de narcose.
- U wordt één dag opgenomen bij het Chirurgisch Dagcentrum niveau 2. [Volg H-2 groen.](#) Dezelfde dag mag u weer naar huis.
- U moet nuchter zijn voor de operatie.
- Het kan nodig zijn om een aantal dagen voor de operatie bepaalde medicijnen te stoppen, bijvoorbeeld bloedverdunners. Als dat zo is informeert de plastisch chirurg u hierover.
- Krijgt u algehele anesthesie, neem dan een begeleider mee naar het ziekenhuis. Na de operatie mag u zelf niet aan het verkeer deelnemen.
- U moet zelf een stevige haarband kopen die de oren goed bedekt.

### De operatie

Bij jongeren vanaf 16 jaar en bij volwassenen gebeurt de operatie onder plaatselijke anesthesie (verdooving). Bij kinderen onder de 16 jaar wordt de operatie onder algehele anesthesie uitgevoerd. Zij blijven daarvoor één dag op het Chirurgisch Dagcentrum. De operatie duurt meestal anderhalf uur. De plastisch chirurg maakt een snee aan de achterkant van het oor. Vervolgens geeft hij het kraakbeen van het oor opnieuw vorm. De overtollige huid aan de achterkant van het oor wordt verwijderd en de huid weer gehecht.

Na een oorcorrectie krijgt u een strak verband (tulband) om het hoofd. U krijgt afspraken mee bij ontslag voor controle op de polikliniek Plastische Chirurgie.

Als het verband afzakt of los laat voor de polikliniekcontrole, neem dan u contact op met de polikliniek Plastische Chirurgie.

### Complicaties

- Het rechtzetten van afstaande oren heeft dezelfde risico's als elke andere operatie. De wond kan gaan nabloeden of er kan een infectie optreden, maar dit komt zelden voor.
- De resultaten van oorcorrecties zijn over het algemeen goed. Kraakbeen is echter een weerbarstig soort weefsel dat de neiging heeft terug te keren in zijn oorspronkelijke vorm. We kunnen daarom nooit garanderen dat de oren altijd recht zullen blijven staan.
- Een enkele keer kan het noodzakelijk zijn om nóg een correctie uit te voeren, maar een symmetrisch resultaat is ook dan geen garantie.



Voor de operatie



Na de operatie

- Soms ontstaat er enkele maanden na de operatie overtollig littekenweefsel dat er uitziet als een dikke zwelling aan de achterkant van het oor. Als u hier last van heeft, meld dit dan zo snel mogelijk aan uw plastisch chirurg. Dan kan er tijdig gestart worden met aanvullende littekenbehandeling.

## Controle

Na een week komt u naar de polikliniek Plastische Chirurgie, het operatieverband en ook de hechtingen of hecht draad knooppjes worden verwijderd. Vanaf dat moment moet de haarband gedragen worden, twee weken dag en nacht, daarna nog twee weken 's nachts. Dit is om te voorkomen dat de oorschelp naar voren buigt. U mag uw haren weer wassen, de oren deppend drogen en eventueel uw haren voorzichtig föhnen! Hierna moet de haarband weer om. Na zes weken komt u op controle bij de plastisch chirurg.

## Weer thuis

Het komt vaak voor dat de oorschelpen nog wekenlang rood, gezwollen en gevoelig blijven. Geleidelijk aan verdwijnt dit. Tegen de pijn kunnen pijnstillers worden genomen, zoals paracetamol. Neem bij extreme pijn en nabloeden direct contact op met de plastisch chirurg. Meestal gebruiken we oplosbare hechtingen. Deze verdwijnen in principe vanzelf. Andere hechtingen worden na één tot twee weken verwijderd op de polikliniek. Na een week mag u weer gaan werken of naar school. Sporten mag weer na vier weken.

## Vergoeding van de kosten

De verzekering vergoedt in een aantal gevallen de kosten van het corrigeren van afstaande oren. Kinderen tot ongeveer 13 jaar krijgen de kosten meestal wel vergoed. De verzekeraar gaat ervan uit dat deze groep lijdt onder het hebben van afstaande oren. Daarom hoeft bij de aanvraag voor de operatie bij kinderen geen psychiatrisch rapport te worden bijgevoegd. Wij adviseren u altijd om vooraf bij uw ziektekostenverzekeraar na te vragen of de operatie wordt vergoed. Dit is afhankelijk van de polisvoorwaarden.

## Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan zal de plastisch chirurg deze tijdens het spreekuur graag beantwoorden. Het is handig als u uw vragen van tevoren op papier zet.

Polikliniek Plastische Chirurgie	043-387 70 00
Chirurgisch Dagcentrum	043-387 24 00

## Website

- [mumc.nl](http://mumc.nl)
- [gezondidee.mumc.nl](http://gezondidee.mumc.nl)
- [nvpc.nl](http://nvpc.nl)

*Odin 036587 / juli 2018*

Bezoekadres  
P. Debyelaan 25  
6229 HX Maastricht

Postadres  
Postbus 5800  
6202 AZ Maastricht

Algemeen telefoonnummer  
043-387 65 43  
[www.mumc.nl](http://www.mumc.nl)