

De hysterosalpingografie (HSG)

Baarmoederfoto

Uw arts heeft een HSG voor u afgesproken. Op dit blad informeren wij u over het onderzoek, de voorbereiding op het onderzoek en over de afspraak.

Doel van het onderzoek

Een HSG wordt gemaakt om de vorm van de baarmoeder en de doorgankelijkheid van de eileiders te beoordelen.

Meestal maakt een HSG deel uit van een vruchtbaarheidsonderzoek.

Een afspraak maken voor een HSG

HSG's worden verricht op de dinsdagmiddag in de oneven weken en donderdagmiddag in de even weken op de afdeling Beeldvorming. Op de polikliniek vult de arts het aanvraagformulier voor het HSG in.

De arts vraagt u om op de eerste dag van uw volgende menstruatie het Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde te bellen. De doktersassistente maakt dan de afspraak voor het HSG voor u.

U vindt de afdeling Beeldvorming op niveau 3. **Volg H - 3 rood.**

Vorbereiding

Een HSG wordt gemaakt nadat het bloedverlies van de menstruatie gestopt is en voordat de eisprong optreedt. Tijdens de HSG moet u er zeker van zijn dat u niet zwanger bent. Daarom moet u vanaf de eerste dag van de menstruatie tot dat het HSG is geweest condooms gebruiken. Overleg met uw arts als u twijfelt of u wel of niet zwanger bent.

Bent u allergisch voor jodium, dan moet u dit voor het onderzoek melden aan uw behandelend arts. Wanneer er wel een allergie is en u dit niet meldt, moet u dit meteen bij binnenkomst en voor het HSG aan de arts melden die het HSG gaat uitvoeren.

Wij gebruiken dan geen jodiumhoudende vloeistoffen.

Om de kans op infecties zo klein mogelijk te maken, adviseren wij u om 3-5 dagen voorafgaand aan het HSG één gram Zithromax (2 tabletten van 500milligram) in te nemen.

Als pijnstilling kunt u Naprosyne gebruiken:

- 500 milligram (1 tablet) 's avonds laat op de dag voor het onderzoek.
- 500 milligram 1 uur voor het HSG.
- Zo nodig nogmaals 500 milligram 8 uur na het HSG.

Voor de Zithromax en Naprosyne krijgt op de polikliniek een recept van de arts die het HSG met u afspreekt.



Het onderzoek

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een arts-assistent, gynaecoloog in opleiding, samen met een röntgenlaborant. U neemt plaats op de onderzoekstafel met uw benen in beensteunen, en de baarmoedermond wordt in beeld gebracht.

Via een katheter wordt er een contrastmiddel via de baarmoedermond in de baarmoeder gebracht. Onder röntgendoorlichting wordt het contrastmiddel langzaam in de baarmoeder gespoten om te zien of uw eileiders open zijn.

U kunt tijdens het spuiten van het contrastmiddel wat menstruatieachtige buikpijn voelen. Het onderzoek duurt ongeveer 20 minuten in totaal. Na het onderzoek mag u naar huis.

Complicaties en /of bijwerkingen

Het kan het zijn dat u na het onderzoek olie (het contrastmiddel) uit de schede verliest en een beetje bloed verliest.

Bij spoed zoals hevig bloedverlies dat niet stopt, koorts, hevige buikpijn belt u met het Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde en kies 1 voor spoed.

Buiten kantooruren wordt u automatisch doorgeschakeld met de verloskamers.

Weer thuis

U mag thuis uw normale werkzaamheden weer doen.

De uitslag

Iedere dinsdag worden alle HSG's die gemaakt zijn met de stafgynaecologen besproken. Na het zien van alle gemaakte foto's en video's wordt het verdere beleid afgesproken. U wordt terug verwacht op de polikliniek bij uw behandelend arts. Deze bespreekt de uitslag van het HSG met u.

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, neem dan contact met ons op.

Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde- doktersassistente	043 – 387 53 60 8:30uur - 12:00 uur
Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde - verpleegkundige	043 – 387 53 60 13:30uur - 15:30 uur

Website

- <https://centrumvpg.mumc.nl/>

Odin 049875 uitgave maart 2019

Bezoekadres
P. Debyelaan 25
6229 HX Maastricht

Postadres
Postbus 5800
6202 AZ Maastricht

Algemeen telefoonnummer
043-387 65 43
www.mumc.nl