


Instructie imiquimod crème

Behandeling van CIN 2 en CIN 3

U heeft gekozen voor behandeling van uw CIN 2 of CIN 3 met imiquimod crème. In deze brief vindt u informatie over het behandelingschema, wat te doen bij bijwerkingen en de vervolgspraken.

Behandeling

De behandeling bestaat uit twee periodes van 8 weken. U gebruikt de imiquimod driemaal per week. De imiquimod moet vaginaal worden ingebracht, met een applicator (spuitje) die u zelf vult met de imiquimod crème. U gebruikt steeds een half zakje: vul de applicator met het gehele zakje, waarna u de applicator voor de helft leegspuit. De andere helft brengt u vaginaal in. Doe dit 's avonds voor het slapengaan. U mag daarna geen geslachtsgemeenschap meer hebben. 's Ochtends spoelt u de restjes crème onder de douche weg. Wij adviseren u om de dag na het inbrengen van de crème een tampon te gebruiken (wisselen a 4-6 uur). Hiermee voorkomt u irritatie van de schaamlippen, door eventuele afscheiding van de crème.



Behandelingschema en vervolgspraken

Het behandelingschema is als volgt:

1. Acht weken imiquimod
2. Twee weken geen imiquimod
3. Daarna een kolposcopie met biopten
 - Indien de afwijking is verdwenen: stop imiquimod behandeling
 - Indien de afwijking nog aanwezig is: doorgaan met imiquimod behandeling (nogmaals 8 weken volgens hetzelfde schema)
 - Indien de afwijking is toegenomen: behandeling met LLETZ

Patiënteninformatie

Hieronder vindt u een overzicht van het behandelingschema en de vervolgfafspraken tijdens de behandeling met imiquimod.

Week	
Week 0	Start behandeling met imiquimod-crème
Week 1	Telefonische afspraak
Week 8	Stop imiquimod
Week 10	Kolposcopie met biopten
Week 11	Telefonische afspraak, uitslag van de biopten. <ul style="list-style-type: none">○ afwijking verdwenen: stop imiquimod behandeling○ afwijking nog aanwezig: nogmaals 8 weken imiquimod○ afwijking toegenomen: behandeling met lisexcisie
Week 19	Stop imiquimod (indien herstart)
Week 21	Kolposcopie met biopten (indien nogmaals imiquimod gebruikt)
Week 22	Telefonische afspraak, uitslag van de biopten. <ul style="list-style-type: none">○ afwijking verminderd of verdwenen: einde behandeling○ afwijking nog aanwezig: behandeling met lisexcisie
Na 6 maanden	Uitstrijkje

Wat te doen bij bijwerkingen

Welke bijwerkingen kunt u verwachten

In eerdere onderzoeken met Imiquimod crème werden weinig ernstige bijwerkingen beschreven. De meest voorkomende bijwerking was *vaginale afscheiding* tijdens de behandeling en soms ook wat *pijn of jeuk in de vagina*. Andere bijwerkingen die kunnen voorkomen zijn *spierpijn en spierstijfheid, vermoeidheid, hoofdpijn* en een *koortsig gevoel*.

Wat te doen bij bijwerkingen

Indien u klachten krijgt van *spierpijn en spierstijfheid, vermoeidheid, hoofdpijn* en/of een *koortsig gevoel*, dan kunt u het volgende schema doorlopen:

1. Gebruik pijnstillers op de dagen dat u de klachten heeft.
 - a. Viermaal daags paracetamol 1000mg (twee tabletten)
 - b. Zo nodig ook driemaal daags ibuprofen 400mg
2. Indien dat onvoldoende helpt, neem dan contact op met onze specialistisch verpleegkundige (contactgegevens staan hieronder). Zij zal u adviseren om de dosering van de imiquimod te verlagen of tijdelijk te stoppen.

Belangrijk om te weten

U mag tijdens de behandeling met imiquimod *niet zwanger worden*. U moet daarom anticonceptie gebruiken tijdens de behandelperiode. Gebruikt u nog géén anticonceptie, dan kan uw gynaecoloog u adviseren over de mogelijkheden.

Contact

Contactpersoon: Charlotte Penders, verpleegkundig specialist
(bij afwezigheid: Moniek Kamps)
Telefoon kantooruren: 043-387 65 43, vragen naar sein 5536/ 043-3874241
Telefoon buiten kantooruren: 043-387 62 40 (afdeling verloskunde)

Websites

- www.mumc.nl

Odin: / uitgave:

Bezoekadres
P. Debyelaan 25
6229 HX Maastricht

Postadres
Postbus 5800
6202 AZ Maastricht

Algemeen telefoonnummer
043-387 65 43
www.mumc.nl