

Kijkonderzoek in de longen

Bronchoscopie

Na overleg met uw arts is besloten tot kijkonderzoek in de longen (bronchoscopie). Het onderzoek vindt plaats op de afdeling Longfunctie op niveau 2.

Volg route G - groen.

Vorbereiding

- De nacht vóór het onderzoek mag u na 24.00 uur niet meer eten, drinken en roken. U moet het onderzoek volledig nuchter ondergaan.
- Kies voor kleding die niet te strak in de hals zit.
- Vraag aan uw behandelend arts of u de medicijnen die u heeft, mag blijven gebruiken voorafgaand aan het onderzoek. Wanneer u bloedverdunnende middelen gebruikt, geef dit dan door aan de arts die het onderzoek doet.
- Geef het ook aan als u diabetespatiënt bent. We plannen dan speciaal voor u zo vroeg mogelijk een afspraak. Overleg met uw behandelend arts hoeveel insuline u eventueel mag spuiten.



1: met een dunne, flexibele slang wordt in uw longen gekeken.

Bronchoscopie

Bij een bronchoscopie kijkt de arts met een dunne flexibele slang in uw longen of hij afwijkingen ziet. Het onderzoek doet geen pijn.

Een eventueel kunstgebit moet u even uitdoen. Daarna wordt uw keel verdoofd met een verdovingsvloeistof of spray. Het onderzoek is op geen enkel moment pijnlijk en duurt ongeveer twintig minuten.

Tijdens het onderzoek bekijkt de arts de binnenkant van uw longen. Tijdens de verdoving en het onderzoek kunt u gewoon rustig blijven ademen. U komt op uw rug op een onderzoekstafel te liggen. Verder krijgt u een bijtring tussen de kaken om de scoop te beschermen. Het zuurstofgehalte en uw polsslag worden voortdurend gemeten.

Na het onderzoek

Na het onderzoek moet u nog een half uurtje op de afdeling Longfunctie blijven. Hierna kunt u gewoon naar huis. We adviseren iedereen dringend om na afloop niet zelf meer aan het verkeer deel te nemen. Neem een begeleider mee of kom met een taxi of het openbaar vervoer. De lichte verdoving kan namelijk de rijvaardigheid beïnvloeden. Na de bronchoscopie mag u twee uur niets eten of drinken om te voorkomen dat u zich verslikt. Door het onderzoek kan uw keel wat gevoelig zijn en kunt u tijdelijk hees worden. Dit duurt gelukkig nooit lang. In het geval u opgenomen bent in het ziekenhuis, gaat u na het onderzoek gewoon weer naar uw verpleegafdeling.

Mogelijke complicaties

Na een bronchoscopie komen weinig complicaties voor. Wanneer er zich na het onderzoek toch bijzonderheden voordoen, neemt u contact op met de Longafdeling A3 (T 043 - 387 63 10). Vraag dan naar de dienstdoende longarts. Doe dit met name als u na het onderzoek één of meer van de volgende klachten heeft:

- koorts (een temperatuur hoger dan 38,5° C) en/of koude rillingen binnen 24 uur na het onderzoek
- kortademigheid
- bloed opgeven
- pijn

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, neem dan contact met ons op.

Verpleegafdeling A3 Longafdeling	043 - 387 63 10 bij klachten na het onderzoek
Afdeling Longfunctie	043 - 387 72 25 tijdens kantooruren
Spoed Eisende Hulp (SEH)	043 - 387 67 00 buiten kantooruren en in het weekend; vraag naar de dienstdoende longarts

Websites

- www.mumc.nl
- <https://www.mumc.nl/patienten-en-bezoekers/specialisme/longfunctie/over-longfunctie>
- www.gezondidee.mumc.nl

Odin 032656 / uitgave februari 2017

Bezoekadres
P. Debyelaan 25
6229 HX Maastricht

Postadres
Postbus 5800
6202 AZ Maastricht

Algemeen telefoonnummer
043-387 65 43
www.mumc.nl