

Kijkonderzoek in de longen met roesje

Bronchoscopie / echo-bronchoscopie

Na overleg met uw arts is besloten tot kijkonderzoek van de longen mét een roesje. Het onderzoek vindt plaats op de afdeling Longfunctie op niveau 2.

Volg route G - groen.

Geef zo spoedig mogelijk door aan de Functieafdeling van de longen als u verhinderd bent voor uw afspraak.

Vorbereiding

- U mag zes uur vóór het onderzoek niet meer eten, drinken en roken. U moet het onderzoek volledig nuchter zijn.
- U mag uw luchtwegmedicatie (inhalators) gewoon gebruiken.
- Kies voor kleding die niet te strak in de hals zit.
- Als er nog onduidelijkheid is over uw medicijngebruik, neem dan contact op met uw behandelend arts; denk met name aan bloedverdunners.
- Geef het ook aan als u diabetespatiënt bent. We plannen dan speciaal voor u zo vroeg mogelijk een afspraak. Overleg met uw behandelend arts hoeveel insuline u eventueel mag spuiten
- Deze voorbereiding geldt voor beide onderzoeken.

Wij vragen u 15 minuten voor de afgesproken tijd aanwezig te zijn.

Het onderzoek

Bij een bronchoscopie of echo-bronchoscopie kijkt de arts met een dunne flexibele slang in uw longen of hij afwijkingen ziet. Het onderzoek doet geen pijn en u kunt na het onderzoek en een korte observatie weer naar huis. Hieronder staat aangekruist welke van de twee onderzoeken bij u wordt gedaan.

Bronchoscopie

Tijdens het onderzoek bekijkt de arts de binnenkant van uw longen. Het onderzoek is op geen enkel moment pijnlijk en duurt ongeveer twintig minuten.

Vlak voor het onderzoek krijgt u van de arts een infuus. Hiermee wordt een slaapmiddel ('roesje') toegediend, dat u helpt te ontspannen. Een eventueel kunstgebit moet u even uit doen.

Daarna wordt uw keel verdoofd met een verdovingsvloeistof of spray. Tijdens de verdoving en het onderzoek kunt u gewoon rustig blijven ademen. U ligt op uw rug op een onderzoekstafel. Verder krijgt u een bijtring tussen de kaken om de scoop te beschermen. Het zuurstofgehalte en uw polsslag worden voortdurend gemeten.

Echo-bronchoscopie

Tijdens dit onderzoek wordt gebruikgemaakt van echogolven voor de exacte plaatsbepaling. Hier merkt u niks van! Het onderzoek is op geen enkel moment pijnlijk en duurt ongeveer twintig minuten. Vlak voor het onderzoek krijgt u van de arts een infuus. Hiermee wordt een slaapmiddel ('roesje') toegediend, dat u helpt te ontspannen. Een eventueel kunstgebit moet u even uit doen. Daarna wordt uw keel verdoofd met een verdovingsvloeistof of spray. Tijdens de verdoving en het onderzoek kunt u gewoon rustig blijven ademen.



1: met een dunne, flexibele slang wordt in uw longen gekeken

U ligt op uw rug op een onderzoekstafel. Verder krijgt u een bijtring tussen de kaken om de scoop te beschermen. Het zuurstofgehalte en uw polsslag worden voortdurend gemeten.

Na het onderzoek (bronchoscopie of echo-bronchoscopie)

Omdat u een slaapmiddel ('roesje') heeft gekregen, verblijft u na het onderzoek één tot twee uur op het Dagcentrum of een verpleegafdeling ter observatie.

Als u opgenomen bent in het ziekenhuis gaat u na het onderzoek weer naar uw verpleegafdeling.

U mag na een roesje 24 uur niet zelf aan het verkeer deel nemen. Neem een begeleider mee. Kijk ook uit met het bedienen van machines en andere zaken die uw concentratie vragen. Alcohol of andere genotmiddelen mag u 24 uur na het innemen van het slaapmiddel niet gebruiken.

Na de bronchoscopie mag u twee uur niets meer eten of drinken om te voorkomen dat u zich verslikt. Door het onderzoek kan uw keel wat gevoelig zijn en kunt u tijdelijk hees worden. Dit duurt gelukkig nooit lang.

Mogelijke complicaties

Na een bronchoscopie of echo-bronchoscopie komen weinig complicaties voor. Wanneer u thuis toch problemen krijgt, neem dan contact op met de afdeling Longfunctie.

Vraag dan naar de dienstdoende longarts. Doe dit met name als u na het onderzoek één of meer van de volgende klachten heeft:

- Koorts (een temperatuur hoger dan 38,5°C) en/of koude rillingen binnen 24 uur na het onderzoek.
- Kortademigheid.
- Bloed opgeven.
- Pijn.

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, neem dan contact met ons op.

Afdeling Longfunctie	043- 387 72 25 tijdens kantooruren
Spoeisende Hulp (SEH)	043 - 387 67 00 buiten kantooruren en in het weekend; vraag naar de dienstdoende longarts

Websites

- www.mumc.nl
- <https://www.mumc.nl/patienten-en-bezoekers/specialisme/longfunctie/over-longfunctie>
- www.gezondidee.mumc.nl

Odin 032654 /uitgave mei 2019

Bezoekadres
P. Debyelaan 25
6229 HX Maastricht

Postadres
Postbus 5800
6202 AZ Maastricht

Algemeen telefoonnummer
043-387 65 43
www.mumc.nl