

## Kijkonderzoek in de longen

### Bronchoscopie

Na overleg met uw arts is besloten tot een kijkonderzoek in de longen (bronchoscopie). Het onderzoek vindt plaats op de afdeling Longfunctie op niveau 2.

**Volg route G - groen.**

**Geef zo spoedig mogelijk door aan de Functieafdeling van de longen als u verhinderd bent voor uw afspraak.**

### Vorbereiding

- U mag zes uur vóór het onderzoek niet meer eten, drinken en roken. U moet voor het onderzoek volledig nuchter zijn.
- U mag uw luchtwegmedicatie (inhalatoren) gewoon gebruiken.
- Kies voor kleding die niet te strak in de hals zit.
- Als er nog onduidelijkheid is over uw medicijngebruik, neem dan contact op met uw behandelend arts ; denk met name aan bloedverdunners.
- Geef ook aan als u diabetespatiënt bent. We plannen uw afspraak dan zo vroeg mogelijk. Overleg met uw behandelend arts hoeveel insuline u eventueel mag spuiten.
- Deze voorbereiding geldt voor beide onderzoeken.

**Wij vragen u 15 minuten voor de afgesproken tijd aanwezig te zijn.**

### Het onderzoek

Bij een bronchoscopie kijkt de arts met een dunne flexibele slang in uw longen of hij afwijkingen ziet.

Een eventueel kunstgebit moet u even uitdoen. Daarna wordt uw keel verdoofd met een verdovingsvloeistof of spray. Het onderzoek is op geen enkel moment pijnlijk en duurt ongeveer twintig minuten.

Tijdens het onderzoek bekijkt de arts de binnenkant van uw longen.

Gedurende de verdoving en het onderzoek kunt u gewoon rustig blijven ademen. U ligt op uw rug op een onderzoekstafel. Verder krijgt u een bijtring tussen de kaken om de scoop te beschermen.

Het zuurstofgehalte en uw polsslag worden voortdurend gemeten.



1: met een dunne, flexibele slang wordt in uw longen gekeken.

### Na het onderzoek

Na het onderzoek wordt u nog even geobserveerd. Als u zich dan goed voelt, kunt u naar huis. Bent u opgenomen in het ziekenhuis, dan gaat u na het onderzoek naar uw verpleegafdeling.

We adviseren iedereen dringend om na afloop van het onderzoek niet zelf aan het verkeer deel te nemen. Neem een begeleider mee of kom met een taxi of het openbaar vervoer. De lichte verdoving kan namelijk de rijvaardigheid beïnvloeden.

Na de bronchoscopie mag u twee uur niets eten of drinken. Dit om te voorkomen dat u zich verslikt. Door het onderzoek kan uw keel wat gevoelig zijn en kunt u tijdelijk hees worden. Dit duurt gelukkig nooit lang

## Mogelijke complicaties

Na een bronchoscopie komen weinig complicaties voor. Wanneer er zich na het onderzoek toch bijzonderheden voordoen, neem dan contact op met de afdeling Longfunctie. Vraag dan naar de dienstdoende longarts. Doe dit met name als u na het onderzoek één of meer van de volgende klachten heeft.

- Koorts, een temperatuur hoger dan 38,5°C en/of koude rillingen binnen 24 uur na het onderzoek.
- Kortademigheid.
- Bloed opgeven.
- Pijn.

## De uitslag

Uw behandelend arts informeert u over de uitslag bij de eerstvolgende afspraak op de polikliniek longziekten.

## Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, neem dan contact met ons op.

Afdeling Longfunctie

043 - 387 72 25 tijdens kantooruren

Spoeisende Hulp (SEH)

043 - 387 67 00 buiten kantooruren en in het weekend;  
Vraag naar de dienstdoende longarts

## Websites

- [www.mumc.nl](http://www.mumc.nl)
- <https://www.mumc.nl/patienten-en-bezoekers/specialisme/longfunctie/over-longfunctie>
- [www.gezondidee.mumc.nl](http://www.gezondidee.mumc.nl)

*Odin 032656 uitgave mei 2019*

Bezoekadres  
P. Debyelaan 25  
6229 HX Maastricht

Postadres  
Postbus 5800  
6202 AZ Maastricht

Algemeen telefoonnummer  
043-387 65 43  
[www.mumc.nl](http://www.mumc.nl)