

## Linacotide

fabrieksnaam: constella

---

Uw arts heeft met u gesproken over een behandeling met linacotide. In dit blad krijgt u aanvullende informatie over dit medicijn.

### Algemene informatie

Linacotide wordt gegeven bij het prikkelbare darmsyndroom met verstopping (obstipatie). Het wordt alleen voorgeschreven door een Maag-, Darm- en Lever (MDL) arts en alleen als u onvoldoende reageert op andere medicijnen of behandelingen.

Het middel is goedgekeurd voor gebruik bij volwassenen met bovengenoemde aandoening. Als u aan de voorwaarden voldoet, betaalt uw verzekering het medicijn en krijgt u van uw arts een artsenverklaring die u samen met het recept bij uw apotheek afgeeft.



### Hoe werkt linacotide?

Linacotide bevordert de stoelgang doordat de hoeveelheid vocht in de darm toeneemt en de ontlasting sneller door de dikke darm wordt gevoerd. De ontlasting dikt hierdoor minder snel in waardoor u minder last van verstopping hebt. Verder kan linacotide de overgevoeligheid van de darmen verminderen waardoor de pijnklachten afnemen.

### Hoe gebruikt u de linacotide?

Linacotide is een capsule 290 microgram die u één maal daags inneemt een half uur voor de maaltijd in. Als het medicijn bij u werkt, krijgt u een vervolgrecpt. Wilt u stoppen met de medicatie, bespreek dit dan eerst uw arts voordat u stopt.

### Wanneer moet u linacotide **niet** gebruiken

- Bij ernstige of langdurige diarree (regelmatig of waterige ontlasting gedurende zeven dagen of langer).
- Licht gevoel in het hoofd.
- Duizeligheid.
- Flauwvallen.
- Bijwerkingen die niet van vanzelf weggaan.

Hebt u last van een van bovengenoemde klachten, neem dan contact met uw arts.

**Let op:** Sommige medicijnen kunnen minder goed functioneren bij ernstige of langdurige diarree klachten, zoals orale anticonceptiemiddelen of medicijnen waarvoor een exacte dosering nodig is. Sommige medicijnen kunnen het risico op diarree verhogen wanneer ze gecombineerd worden, zoals protonpompremmers (bij overmatig maagzuurproductie

## Wat zijn de bijwerkingen?

Bijwerkingen zijn vaak van korte duur bij het opstarten van de medicatie. De meest voorkomende bijwerkingen na het starten van de medicatie zijn:

- diarree (bij ca. 15% van de patiënten);
- buikpijn;
- gevoel;
- winderigheid, duizeligheid
- Soms uitdroging, verminderde eetlust.

## Bent u zwanger?

Wij raden u af om linaclotide in te nemen tijdens de zwangerschap of bij borstvoeding in verband met geen of beperkte hoeveelheid gegevens over het veilig gebruik ervan in deze situaties.

## Contact

Hebt u na het lezen van deze informatie nog vragen, neem dan contact met ons op.

Polikliniek MDL

043-387 51 00 tijdens kantooruren

## Website

- [www.mdl.mumc.nl](http://www.mdl.mumc.nl)
- [www.mumc.nl](http://www.mumc.nl)
- [www.mlids.nl](http://www.mlids.nl)
- [www.gezondidee.mumc.nl](http://www.gezondidee.mumc.nl)

*Odin 048241 augustus 2018*

Bezoekadres  
P. Debyelaan 25  
6229 HX Maastricht

Postadres  
Postbus 5800  
6202 AZ Maastricht

Algemeen telefoonnummer  
043-387 65 43  
[www.mumc.nl](http://www.mumc.nl)