

Ontslaginformatie Beeldvorming

PRG-sonde de verzorging; informatie voor thuis

Bij u is een voedingssonde, de Percutane Radiologische Gastrostomie (PRG) geplaatst.

Op dit blad krijgt u informatie over het thuis verzorgen van deze sonde.

Deze informatie is bedoeld voor u als patiënt, maar ook voor uw familie, de thuiszorg, uw huisarts en uw specialist

Afspraken Beeldvorming

Voor het verwijderen van de hechtingen moet u op locatie Beeldvorming 3 zijn.

Volg H-3 / lift H-niveau 3 (rood)



Locatie Beeldvorming 3	Hechtingen verwijderen	Datum	Tijd

Gegevens PRG

Wanneer is de PRG bij u geplaatst?	
Merk van de PRG	
Maat/soort	
Opmerkingen	

Na ontslag

Tot 10 dagen

Twee maal daags de sonde doorspoelen met 20 milliliter lauw water. U mag de eerste week na het inbrengen van de PRG géén bad nemen. Douchen mag wel vanaf drie dagen na het inbrengen.

Vanaf 10 dagen

Hechtingen verwijderen (zie afspraken). Na elke sondevoeding of andere toediening via de PRG, spoelt u de sonde door met 20 milliliter lauw water. Gebruikt u de PRG (tijdelijk) niet dan de sonde tweemaal daags doorspoelen met 20 milliliter lauw water.

Verzorging van de PRG

Normaal gesproken vervangen wij de PRG om de 12 maanden.

Een afspraak hiervoor kunt u plannen via de Interventiekamer van de afdeling Beeldvorming

T: 043-387 49 15 op werkdagen van 08:00-16:45 uur.

Patiënteninformatie

Het is van belang dat u de PRG op de juiste wijze verzorgt.

- Was uw handen voor dat u de sonde gaat verzorgen.
- Is de insteekopening rood of ontstoken reinig de insteekopening dan met een gaasje gedrenkt in desinfectans (hibicet).
- Droog de huid goed met een onsteriel gaasje.
- Plak een schone pleister of gaasje over de insteekopening bij wondlekkage; plak géén pleister als er geen wondlekkage is.
- Spoel de PRG door met 20 milliliter lauw water na elke sondevoeding.
- Spoel de PRG twee keer per dag door met 20 milliliter lauw water als u geen voeding en/of medicatie via de sonde gebruikt.

Belangrijk!

Medicatie alleen zorgvuldig fijngemalen door de PRG toedienen en vervolgens met enige kracht extra doorspoelen. Als de medicatie onvoldoende fijngemalen is, kan de PRG snel verstopt raken.

Complicaties/bijwerkingen

De kans op complicaties is beperkt, maar complicaties kunnen toch optreden zoals:

- Symptomen van infectie (koorts, roodheid, zwelling bij de insteekplaats).
- Pijnklachten of braken.
- Lekkage rond de PRG.
- Verstopping van de PRG.
- Uitvallen van de PRG.

Neem contact op met de Interventiekamer van de afdeling Beeldvorming als één van deze complicaties zich voordoet.

Wat te doen bij het uitvallen van de PRG?

U moet dan direct contact op te nemen met de interventiekamer van de afdeling Beeldvorming. De PRG moet met enige spoed opnieuw worden ingebracht om lekkage in de vrije buikholte te voorkomen.

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, neem dan contact met ons op.

Afdeling Beeldvorming 043-387 75 00 op werkdagen van 8:00 uur en 16:45 uur

Interventiekamer Radiologie 043-387 49 15 op werkdagen en in het weekend
van 08:00 uur tot 23:00 uur

Telefooncentrale MUMC+ 043-387 54 32 en vragen naar sein 5221
dagelijks van 23:00uur tot uur 08:00 uur

Websites

- www.mumc.nl
- www.gezondidee.mumc.nl

Odin 036761 Uitgave oktober 2019

Bezoekadres
P. Debyelaan 25
6229 HX Maastricht

Postadres
Postbus 5800
6202 AZ Maastricht

Algemeen telefoonnummer
043-387 65 43
www.mumc.nl



Maastricht UMC+