

## Pijnbestrijding tijdens uw bevalling

### Informatie over de epidurale verdoving (ruggenprik)

#### **Voordelen van epidurale verdoving**

- Biedt meestal uitstekende pijnverlichting.
- De dosis of het type lokale verdoving kan soms variëren, zodat u de benen in meer of mindere mate nog kunt bewegen.
- Over het algemeen heeft een epidurale verdoving geen invloed op uw baby.
- Als een keizersnede noodzakelijk is, kan de anesthesioloog de verdoving via de katheter aanvullen of versterken en is meestal geen extra prik nodig.



#### **Inbrengen van de epidurale katheter**

- Soms duurt het even, tot een half uur na telefonisch contact, voordat er een anesthesioloog (in opleiding) beschikbaar is om de epiduraal te prikken.
- Vooraf krijgt u een infuus ingebracht.
- Tijdens het inbrengen van de epidurale katheter mag u niet bewegen en moet u de anesthesioloog waarschuwen als u een wee krijgt.
- Het inbrengen van de epidurale katheter varieert van 10 minuten tot ruim een half uur; soms zijn er meerdere prikgingen nodig voordat de epidurale katheter goed zit. Daarna duurt het nog eens 5 tot 15 minuten voor de verdoving werkt.
- In sommige gevallen werkt de epidurale katheter niet goed en moet deze worden aangepast of vervangen.

#### **Mogelijke problemen bij epidurale verdoving**

- Herhaalde toediening van sterkere lokale verdoving kan leiden tot een tijdelijk slap gevoel in de benen en vergroot mogelijk de kans dat de bevalling met behulp van een verlostang of vacuümextractie moet worden uitgevoerd.
- De epidurale verdoving kan de tweede fase van de bevalling mogelijk iets vertragen.
- Temperatuursverhoging (38° of hoger) treedt in ongeveer 20% op na epidurale verdoving. Het is meestal niet goed mogelijk om een onderscheid te maken tussen een infectie als oorzaak, of de epidurale anesthesie zelf. Epidurale anesthesie heeft namelijk effect op de lichaamstemperatuur (zonder dat dit een echt probleem lijkt te zijn). Vaak wordt zekerheidshalve antibiotica gestart, soms al tijdens de bevalling, en uw kind zal meestal geobserveerd worden voor tekenen van een infectie, met of zonder antibiotica.
- Naast temperatuursverhoging kunnen ook jeuk en lage bloeddruk optreden.
- De plek waar de naald wordt ingebracht kan gevoelig worden. Dit is meestal na een paar dagen over. Rugpijn wordt **niet** veroorzaakt door de epidurale verdoving en is na elke zwangerschap een normaal verschijnsel.

Op de achterkant van deze kaart worden de belangrijke risico's van de epidurale verdoving vermeld.

#### **Contact**

Hebt u na het lezen van deze informatie nog vragen, stel ze gerust.

Polikliniek Anesthesie  
043-387 45 00

# Patiënteninformatie

Type risico	Hoe vaak komt het voor?*
Temperatuursverhoging (38° of hoger) <i>Waarvoor vaak behandeling van de moeder met antibiotica, en eventueel observatie en behandeling van uw kind met antibiotica door de kinderarts</i>	1:5
Daling van de bloeddruk <i>Deze wordt dan meteen behandeld met medicijnen</i>	Af en toe
Verlicht de pijn bij de bevalling cq. keizersnede onvoldoende, zodat andere vormen van pijnbestrijding noodzakelijk zijn	Af en toe
Hoofdpijn <i>Komt vaak voor na een bevalling, maar is zelden te wijten aan de epiduraal</i>	0.04-6% van de vrouwen krijgen mogelijk een te diepe punctie, dit kan leiden tot vocht lekkage waardoor hoofdpijn kan ontstaan
Zenuwbeschadiging (gevoelloze plek op been of voet of een slap gevoel in het been)	Komt relatief vaak tijdelijk voor echter extreem zelden te wijten aan de epiduraal
Tijdelijke zenuwschade	1:5000
Permanente zenuwschade (verlamming)	1:240.000
Epiduraal abces of hematoom (bloeduitstorting)	1:170.000
Meningitis (hersenvliesontsteking)	1:100.000
Onvoorziene bewusteloosheid	Extreem zeldzaam

\*De genoemde cijfers betreffen schattingen uit de literatuur en zijn variabel gezien de zeldzaamheid van sommige complicaties. Ze kunnen verschillen per land/regio/ziekenhuis.

## Website

- [www.mumc.nl](http://www.mumc.nl)
- [www.gynaecologie.mumc.nl](http://www.gynaecologie.mumc.nl)
- [www.anesthesiologie.mumc.nl](http://www.anesthesiologie.mumc.nl)
- [www.gezondidee.mumc.nl](http://www.gezondidee.mumc.nl)

Odin 036567 / uitgave december 2015

Bezoekadres  
P. Debyelaan 25  
6229 HX Maastricht

Postadres  
Postbus 5800  
6202 AZ Maastricht

Algemeen telefoonnummer  
043-387 65 43  
[www.mumc.nl](http://www.mumc.nl)