

PRG-sonde; de verzorging

Informatie voor thuis

Bij u is een voedingssonde, de Percutane Radiologische Gastrostomie (PRG) geplaatst. Op dit blad krijgt u informatie over het thuis verzorgen van deze sonde. Deze informatie is bedoeld voor u als patiënt, maar ook voor uw familie, de thuiszorg, uw huisarts en uw specialist. U vindt de afdeling Radiologie op niveau 3.

Volg H-3 / lift H-niveau 3 (rood)



Afspraken Radiologie

		Datum	Tijd
Afdeling Radiologie	Hechtingen verwijderen		

Gegevens PRG

Wanneer is de PRG bij u geplaatst?
Merk van de PRG
Maat/soort
Hechtingen verwijderen op (<i>datum ook noteren bij afspraken</i>)
Opmerkingen

Na ontslag

Tot 10 dagen

Twee maal daags de sonde doorspoelen met 20 milliliter lauw water. U mag de eerste week na het inbrengen van de PRG géén bad nemen. Douchen mag wel vanaf drie dagen na het inbrengen.

Vanaf 10 dagen

Hechtingen verwijderen (zie afspraken). Na elke sondevoeding of andere toediening via de PRG spoelt u de sonde door met 20 milliliter lauw water. Gebruikt u de PRG (tijdelijk) niet dan de sonde tweemaal daags doorspoelen met 20 milliliter lauw water.

Verzorging van de PRG

- Was uw handen voor dat u de sonde gaat verzorgen.
- Is de insteekopening rood of ontstoken reinig de insteekopening dan met een gaasje gedrenkt in desinfectans (hibicet).
- Droog de huid goed met een onsteriel gaasje.
- Plak een schone pleister of gaasje over de insteekopening bij wondlekkage; plak géén pleister als er geen wondlekkage is.
- Spoel de PRG door met 20 milliliter lauw water na elke sondevoeding.
- Spoel de PRG twee keer per dag door met 20 milliliter lauw water als u geen voeding en/of medicatie via de sonde gebruikt.

Belangrijk! Medicatie alleen zorgvuldig fijngemalen door de PRG toedienen en vervolgens met enige kracht extra doorspoelen. Als de medicatie onvoldoende fijngemalen is, kan de PRG snel verstopt raken.

Complicaties/bijwerkingen

De kans op complicaties is beperkt, maar complicaties kunnen toch optreden zoals:

- Symptomen van infectie (koorts, roodheid, zwelling bij de insteekplaats).
- Pijnklachten of braken.
- Lekkage rond de PRG.
- Verstopping van de PRG.
- Uitvallen van de PRG.

Neem contact op met uw behandelend arts, uw huisarts of de Spoedeisende Hulp (SEH) als één van deze complicaties zich voordoet. Zij kunnen, indien nodig, contact opnemen met de interventiekamer Radiologie via de telefooncentrale van het MUMC+ (24 uur/dag).

Wat te doen bij het uitvallen van de PRG?

Vroeg (binnen 10 dagen na het inbrengen): Direct contact opnemen met de interventiekamer Radiologie. De PRG moet met enige spoed opnieuw worden ingebracht om lekkage in de vrije buikholte te voorkomen.

Laat (11 dagen of meer na het inbrengen): Contact opnemen met de interventiekamer Radiologie. PRG zo snel mogelijk opnieuw inbrengen omdat het toegangskanaal zich anders heeft gesloten (binnen 12-24 uur). Indien mogelijk kan tijdelijk een andere katheter (bijvoorbeeld een blaaskatheter) tot in de maag worden opgeschoven om op deze manier de toegang te behouden.

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen dan kunt u met ons contact opnemen. De afdeling Radiologie is van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 16.45 uur telefonisch bereikbaar.

Afdeling Radiologie	043-387 75 00 (Op werkdagen van 8.00 en 16.45 uur)
Interventiekamer Radiologie	043-387 49 15 (Op werkdagen en in het weekend van 08.00 uur tot 23.00 uur)
Telefooncentrale MUMC+	043-387 54 32 en vragen naar sein 6462 (Dagelijks van 23.00 tot uur 08.00 uur)

Websites

- www.mumc.nl
- www.gezondidee.mumc.nl

Odin 036761 / uitgave augustus 2016

Bezoekadres
P. Debyelaan 25
6229 HX Maastricht

Postadres
Postbus 5800
6202 AZ Maastricht

Algemeen telefoonnummer
043-387 65 43
www.mumc.nl