


## Prostaatonderzoek

### Het nemen van een prostaatbiopt met behulp van echografie

Samen met uw behandelend uroloog heeft u besproken dat u een prostaatonderzoek zult ondergaan waarbij weefsel uit de prostaat (prostaatbiopt) wordt weggenomen. Dit betreft een echografisch onderzoek. Hierbij wordt een langwerpig instrument (echoprobe) via de anus in de endeldarm gebracht.

Tijdens dit onderzoek zendt het instrument geluidsgolven uit. Deze geluidsgolven worden omgezet in bewegende beelden, die op een monitor kunnen worden bekeken. Zo kan de arts de prostaat en de omgeving goed beoordelen en uiteindelijk biopten nemen.



1. Het nemen van een prostaatbiopt met behulp van echografie

### Vorbereiding

De uroloog heeft antibiotica voorgeschreven om de kans op een infectie na het onderzoek te verkleinen. Neem deze in zoals op het etiket staat vermeld. Wanneer u bloedverdunnende middelen gebruikt, is het belangrijk om dit te melden aan de uroloog. Hij vertelt u of u tijdelijk moet stoppen of dat u deze kunt blijven gebruiken.

### Onderzoek

Het onderzoek vindt plaats op de Functieafdeling Urologie op niveau 2. Volg route G.

De verpleegkundige roept u op en brengt u naar een kleedkamer. Hier vragen wij u uw onderkleding en schoenen uit te trekken. U mag de bovenkleding aanhouden. Wanneer u er klaar voor bent, neemt u plaats op de onderzoekstafel. U ligt op uw rug met de benen gespreid in de beensteunen. Voor het onderzoek voelt de behandelend arts eerst via de anus naar uw prostaat.

Tijdens het onderzoek brengt de arts via de echoprobe een dunne naald naar binnen om zo een klein stukje weefsel (biopt) uit de prostaat te nemen. Afhankelijk van de grootte van de prostaat neemt hij 8 tot 12 biopten. Dit maakt een klikkend geluid. Het nemen van een biopt kan kort een lichte pijn geven. Na het onderzoek stopt de uroloog een soort tampon in de anus om het eventuele bloeden te stelpen. Deze tampon lost vanzelf op of komt met de ontlasting mee naar buiten. De prostaatbiopten worden opgestuurd voor onderzoek.

Het onderzoek duurt ongeveer 15 minuten.

## Na het onderzoek

Na het prostaatonderzoek kunt u meteen naar huis. Wij raden u aan om met het openbaar vervoer te komen dan wel iemand mee te nemen die u naar huis brengt. Wij raden u sterk af om met de fiets te komen en om die dag te fietsen.

## Mogelijke complicaties / bijwerkingen

Na het onderzoek kunt u wat bloed verliezen bij de:

- urine
- ontlasting
- zaadlozing (bruine verkleuring, dit kan tot 6 weken erna)

Het bloedverlies is volstrekt onschuldig.

Daarnaast kan het zijn dat u wat vaker moet plassen en dat het plassen wat pijnlijk is. Het is verstandig om goed te drinken.

Neem contact op met de polikliniek Urologie of de Spoed Eisende Hulp wanneer:

- u koorts heeft vanaf 38,5°C en/of meer
- u niet meer kunt plassen
- het frequente en pijnlijk plassen langer dan een week aanhoudt.

## De uitslag

Ongeveer twee weken na het prostaatonderzoek komt u op de polikliniek Urologie voor de uitslag.

## Contact

Wij zijn te bereiken op de volgende nummers:

Polikliniek Urologie:	T: 043-387 74 00
Functieafdeling Urologie:	T: 043-387 57 74
Spoed Eisende hulp:	T: 043-387 67 00 (buiten kantooruren)

## Websites

- [www.mumc.nl](http://www.mumc.nl)

*Odin:030761 / uitgave: november 2013*

Bezoekadres  
P. Debyelaan 25  
6229 HX Maastricht

Postadres  
Postbus 5800  
6202 AZ Maastricht

Algemeen telefoonnummer  
043-387 65 43  
[www.mumc.nl](http://www.mumc.nl)