

Transcervicale vlokcentest

Het is mogelijk om al tijdens de zwangerschap een aantal aangeboren afwijkingen op te sporen. Dit kan onder andere met een vlokcentest. Een vlokcentest kan meer duidelijkheid geven over het wel of niet aanwezig zijn van een aandoening bij het ongeboren kind. Er zijn twee methoden om de vlokken te verkrijgen: via de vagina (*transcervicale vlokcentest*) en via de buikwand (*transabdominale vlokcentest*). In dit blad krijgt u meer informatie over de transcervicale vlokcentest.


In het patiëntinformatieblad 'Prenatale Genetica' vindt u informatie wanneer u voor zo'n vlokcentest in aanmerking komt. Een afspraak voor een vlokcentest kunt u maken via de afdeling Prenatale Diagnostiek Genetica (T: 043-387 58 55). U kunt hier ook terecht met vragen over prenatale diagnostiek. Afhankelijk van wat precies wordt onderzocht, kan een vlokcentest na de ingreep leiden tot een chromosomenonderzoek of een DNA-onderzoek.

Vorbereiding

Wij adviseren u niet alleen te komen in verband met de terugreis. Hoewel u meestal geen klachten zult hebben, kunt u na de ingreep een 'menstruatieachtig gevoel' in de onderbuik hebben. Een volle blaas is voor het afnemen van een vlokcentest noodzakelijk. Daarom mag u twee uur voor de ingreep in ieder geval niet meer plassen. U hoeft niet nuchter te zijn, dus u kunt voor de ingreep gerust eten en drinken. Uw partner mag - indien gewenst - bij de ingreep aanwezig zijn.

De ingreep

De vlokcentest kan verricht worden wanneer u tussen de tien en dertien weken zwanger bent. De test duurt ongeveer tien minuten. Via de baarmoedermond wordt een dun buisje (katheter) in de baarmoeder gebracht en wordt een kleine hoeveelheid vlokkenweefsel uit de moederkoek opgezogen. Een verdoving is hierbij niet nodig omdat een verdoving pijnlijker is dan de ingreep zelf. Als uw bloedgroep rhesus-(D)-negatief is, krijgt u na afloop een ampul anti-rhesus-(D)-immunoglobuline toegediend. Dit om te voorkomen dat u antistoffen aanmaakt tegen rhesus-(D)-positief bloed. Indien uw ongeboren kind rhesus-positief is, kunnen antistoffen namelijk de gezondheid van het kind schaden.



Transcervicale vlokcentest

Na de ingreep

Na de vlokcentest kunt u direct naar huis. Wij raden u aan na de ingreep enkele uren bedrust te houden en de rest van de dag rustig aan te doen. Daarna kunt u uw normale werkzaamheden weer hervatten. Zware lichamelijke inspanning, intensief sporten, zwemmen, tampongebruik en geslachtsgemeenschap raden wij gedurende één week na de ingreep af. In het geval u last krijgt van buikkrampen, vochtverlies of bloedverlies, kunt u contact opnemen met uw huisarts, uw

verloskundige of uw gynaecoloog. Overleg met de Polikliniek Prenatale Diagnostiek is ook altijd mogelijk.

Mogelijke complicaties

Er bestaat een risico van 1 tot 2 procent op een miskraam na de vlokcentest. Hiernaast bestaat het 'normale risico' op een spontane miskraam. Na ongeveer 1 op 25 van de vlokcentesten is er geen uitslag. De oorzaak kan zijn dat het niet lukt om de moederkoek te bereiken, dat er niet genoeg vlokken verkregen zijn of dat het in het laboratorium onmogelijk blijkt te zijn de chromosomen voldoende zichtbaar te maken. Het is dan mogelijk een tweede vlokcentest te laten doen, of in een later stadium te kiezen voor een vruchtwaterpunctie.

De uitslag

Bij het maken van de afspraak wordt met u besproken voor welke onderzoeken u in aanmerking komt en van wie u de uitslag ontvangt. Hoe lang u moet wachten op de uitslag hangt er van af of er een chromosomen- of een DNA-onderzoek is geweest. In het geval van een chromosomenonderzoek in het vlokkenmateriaal worden de chromosomen, de dragers van de erfelijke eigenschappen, onderzocht. De uitslag is in dit geval na een week bekend. Bij DNA-onderzoek in vlokkenmateriaal wordt naar een DNA-verandering (mutatie) gezocht. De uitslag hiervan is na één tot drie weken bekend. In de praktijk krijgt u normaal gesproken binnen vier weken de uitslag.

Contact

Heeft u na de ingreep vragen of klachten. Dan kunt u altijd contact opnemen met de Polikliniek Prenatale Diagnostiek Gynaecologie (Echocentrum).
Telefoon: 043-3877762

Websites

- www.gezondidee.mumc.nl
- www.mumc.nl

Odin 034724 / uitgave: mei 2015

Bezoekadres
P. Debyelaan 25
6229 HX Maastricht

Postadres
Postbus 5800
6202 AZ Maastricht

Algemeen telefoonnummer
043-387 65 43
www.mumc.nl

